

聯合報

[illegible]

越軍領袖會議上散解

要求在九十天內
組成新立法機構
少壯派軍人發表公報
對現政府暫仍予支持

超上議會委員
傳多人已被捕

亦經分別予以軟禁

仍繼續維持

仍繼續維持

匪僑人代會

偽政協會也登場

發現其匪營地

規模龐大組織嚴密

重訂十週年

重訂十週年

性·命与活力

誰都希望長壽，
希望永遠年青！

—它使您■精力充沛。■堅強持久。

[illegible][illegible]

聲寶電器公司
酬謝顧客大
贈送！
謹以微薄禮品、

冬天更要
注意血管的安全

免熱

感冒就用



脈宜而

。對體內血尿酸值稍高者，可服用尿酸抑制劑，如秋水仙鹼、蘇達明、丙磺舒等。尿酸值高者，又因尿酸多食之故，應戒食，大體上可採取低嘌呤的飲食，如牛奶、雞蛋、麵食、蔬菜、水果、茶、咖啡等。Cholesterol（膽固醇）大抵含脂肪，在血中與內膽汁起一相互作用，如能抑制其作用，則血中膽固醇，隨時都有過度發生之虞。故服用降膽固醇之藥，如少Cholesterol的卵磷脂，可防止血中膽固醇，進而防止動脈硬化。降低血中膽固醇的血藥，在冬季服用無妨。故降膽固醇藥，治療期

